



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31130 BALMA
Tél. (61) 24 06 51

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel : 80 F
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne
CCP : 8612-11 R Toulouse

01 57 00 - 5 - 83177880

BULLETIN N° 8 DU 20 MAI 1983

CEREALES

BLE D'HIVER

Les stades de développement les plus fréquents vont actuellement de 10-1 à 10-5 (tous les épis hors de la gaine), excepté dans la zone Aveyron-Ségala du Tarn où la majorité des blés sont aux stades 8 à 10.

C'est une époque particulièrement importante pour prendre une décision de traitement qui, nous le rappelons (voir notre bulletin n° 7 du 11 mai), passe obligatoirement par une visite des parcelles.

* MALADIES

SITUATION ET PRECONISATIONS

- Zone 2 (Aveyron et Ségala du Tarn)

Les cultures sont dans l'ensemble assez saines. Aucun traitement n'est à envisager dans l'immédiat. Attendre l'épiaison pour prendre une décision.

- Autres zones

. Variété GALA

Une intervention avec un produit spécifique contre la Septoriose est à envisager dès que 30 % des feuilles n° 2 (en partant du haut de la tige) sont atteintes. Cette situation est très souvent rencontrée, surtout dans les zones 4 (Lauragais) et 5 (Lomagne).

. Variété CASTAN

Elle est attaquée en toutes régions par la Septoriose, la Rouille brune et l'Oïdium.

Seuils d'intervention pour lutter contre ces maladies actuellement :

- Septoriose : 30 % de feuilles n° 2 touchées
- Rouille brune : 30 % de feuilles n° 2 touchées
- Oïdium : 50 % de feuilles n° 2 touchées

Choisir un produit spécifique ou au contraire polyvalent, selon la présence d'une seule ou plusieurs de ces maladies. Consulter le tableau paru dans notre bulletin n° 4 du 29 mars 1983.

. Variété TALENT

La Septoriose et surtout la Rouille brune sont fréquemment présentes. Les seuils d'intervention précédemment définis sont atteints et dépassés dans certaines parcelles du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Intervenir pour cette variété avec un produit efficace contre ces deux maladies et particulièrement performant contre la Rouille brune (TILT, VIGIL).

. Variétés CATON, HARDI et TANGO

Le seuil d'intervention contre la Septoriose est atteint et parfois dépassé dans quelques parcelles du Gers (TANGO et HARDI) et du Sud de La Haute-Garonne (CATON). Ces variétés sont par contre peu attaquées par la Rouille brune.

Choisir un produit efficace seulement contre la Septoriose si une intervention se justifie.

. Variété TOP

Le seuil d'intervention contre la Rouille brune est parfois dépassé dans quelques parcelles de la zone Sud (Haute-Garonne - Ariège).

Choisir un produit actif contre cette maladie en cas de traitement.

* RAVAGEURS

PUCERONS

Ils sont très souvent observés sur le feuillage et parfois sur épis, surtout dans les zones des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège et du Lauragais.

Toute intervention insecticide est actuellement inutile.

ORGE D'AUTOMNE

Stades phénologiques les plus fréquents : 10-5-1 à 10-5-4 (pleine floraison).

Dans l'Aveyron, par contre, les cultures sont aux stades 8 à 10.

De même que sur blé, aucune intervention insecticide n'est à envisager. Dorénavant, sur les orges parvenues en fin de floraison, toute intervention fongicide est inutile.

Dans le département de l'Aveyron, une protection fongicide contre la Rhynchosporiose et la Rouille naine (ou brune) peut encore être envisagée lorsque ces maladies sont présentes sur la feuille n° 3.

*

*

*

*